



RASPADO PERIODONTAL Y ALISADO RADICULAR

El raspado periodontal y alisado radicular es una parte importante de su plan de tratamiento periodontal. Durante estas visitas, su higienista periodontal eliminará la placa blanda y endurecida (cálculo) que se ha acumulado en las raíces de los dientes. Las raíces de sus dientes se suavizarán para que las encías puedan comenzar a sanar. Esperamos que los siguientes comentarios sean de utilidad.

Informe a su médico e higienista de cualquier medicamento (aspirina, antihistamínico, etc.) que esté tomando. Evite tomar aspirina el día anterior y el día de su cita. Usaremos anestesia local para que se sienta cómodo durante su cita. Es posible que deba tomar un medicamento suave para las molestias después de su cita.

Debe comer una comida ligera o de fácil digestión antes de su cita. Limite su consumo de cafeína a una taza de café. Debería poder comer una dieta normal después de su cita.

Planee continuar con su horario regular diario después de salir de la oficina. No tendrá ninguna dificultad para conducir su automóvil cuando salga. El tejido de las encías puede estar algo sensible durante uno o dos días, pero esta sensibilidad no debería interferir con sus planes.

Para su comodidad, le sugerimos que use ropa cómoda el día de su cita de raspado y alisado radicular.

Es muy importante que continúe con los procedimientos diarios de control de placa (cuidado en el hogar) que se le recomendarán. ¡Su ayuda y participación son esenciales para que su tratamiento sea un éxito!

Los pacientes pueden tener algunas molestias después del raspado y alisado radicular durante unos días o quizás una semana. Puede tomar ibuprofeno o Tylenol según sea necesario.